La prairie, un concentré d'idées

Le rendez-vous des fourrages en Normandie
Prairiales Normandie du Pin

INRAE
CHAMBRES D'AGRICULTURE NORMANDIE

Pourquoi et comment décompacter une prairie ?

Parcelles peu productives, difficultés de démarrage en sortie d'hiver, couverture hétérogène du sol… et si la cause était le tassement ?

RETOUR D'UTILISATION DE L'HERBASOL

GIEE GROUPEMENTS D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE ET ENVIRONNEMENTAL

CRDA Manche

Contexte :
- Lolif (50), limon éolien
- Prairie multi-espèces de 4 ans
- Chargement VL important

Itinéraire technique :
- **23 novembre** : passage de l'Herbasol à 15 cm
- 22 mars : déprimage
- Pâturage VL tous les 25-30 jours
- Epandage de fumier

Période	Témoin	Herbasol	Observations
+4,5 mois			En surface : absence de traces du passage, léger avantage aux légumineuses Dans le sol : amélioration de la structure, absence de signes d'hydromorphie, exploration verticale des racines
+12 mois			Effet « restructurant » visible uniquement à intervalles de 60 cm (passage des dents)

Préconisations pour une bonne utilisation :

- Éviter le passage en **conditions humides** (lissage et faible décompaction)
- **Laisser le temps à la prairie** de se ré-installer avant toute intervention
- Privilégier un passage **au printemps après fauche/pâturage** (meilleure reprise) et/ou **accompagner la structuration** avec un sursemis de méteil
- Décompacter trop souvent une parcelle = problème dans le système !

Une prairie dynamique dans un sol tonique !

eau Seine Normandie – Agence de l'eau – Établissement public de l'État
Région Normandie
Champs d'innovation
Orne le Département
Avec la contribution financière du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural CASDAR – Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Union Européenne – Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales