

## Strongles gastro-intestinaux (Ostertagiose)

## Strongles pulmonaires (Dictyaucolose)

### Acquérir une immunité !

- Contact *régulier* et *faible*
- TEC (Temps Effectif de Contact) :  
*3-4 mois min., à 18 mois*  
(pour une immunité pleinement acquise)
- *Assainissement* des pâtures par les *animaux immuns*  
(les Ac bloquent le cycle du parasite)
- *Consolidée* lors de la période *hivernale*  
(sauf si traitement antiparasitaire administré à la rentrée en bâtiments)

*Importance de la bonne gestion en 1<sup>ère</sup> et 2<sup>ème</sup> année de pâturage !!*

Particularités du Dictyaucole	Conséquences	Facteurs de risque
<p><b>Reproduction intense et rapide du parasite et dès + 4°C :</b></p> <p><b>Immunité rapidement acquise mais peu durable</b></p> <p><b>La météo est déterminante :</b></p> <p>La pluie disperse les larves.</p>	<p><b>Manifestations « explosives »</b> de la maladie</p> <p>Déclenchement 3 mois après mise à l'herbe = <b>maladie du 14 juillet</b></p> <p><b>Les adultes</b> recyclent le parasite,</p> <p><b>contaminent les pâtures et y sont sensibles</b></p>	<p><b>Surpâturage</b></p> <p><b>Mélange des âges au pâturage</b></p> <p><b>Introduction de bovins porteurs</b> dans cheptel sain.</p> <p><b>Alternance humidité, chaleur et pluie</b> (Hiver doux, printemps humides)</p>

# Comment se débarrasser des principaux parasites par la gestion du pâturage ?


## Grande douve du foie (Fasciolose)

Parasite des **zones humides**.

Zones à risques :

- Mares
- Prairies marécageuses
- Fossés, ruisseaux
- Zone de piétinement autour des abreuvoirs

Hôte intermédiaire aquatique : **la limnée**.



## Paramphistomes (Paramphistomose)

**Cycle similaire à la douve** avec hôte intermédiaire : **limnée**.

- Les symptômes dépendent de l'état général des animaux
- Bovin = seul hôte définitif
- Survie max. de la limnée = 6 mois
- Gestion par rupture de cycles

L'infestation massive de paramphistomoses apparaît après plusieurs années → accumulation de parasites adultes dans le rumen (peuvent vivre jusqu'à 7 ans)

**La pâture est le meilleur indicateur**

Analyse du milieu : pas de Douve et Paramphistome sans eau !

Recherche des limnées printemps et automne