


Plateforme Sursemis

Plateforme Sursemis


Diagnostic prairial réalisé le 26 juin 2017

		Espèces	abondance
Graminées 75%	bonnes	RGA	50%
		Pâturin des prés	5%
	moyennes médiocres	Vulpin des prés	4%
		Agrostis stolonifère et des chiens	8%
		Houlque molle	7%
Légumineuses 8%		TB	8%
Diverses 17%		Capselle bourse à pasteur	13%
		pissenlit	4%
		Renouée des oiseaux ?	1%



Flore moyenne à
bonne

Mais sol compacté



Agir sur les pratiques:

- Temps de repos parcelle
 - Hersage fin d'hiver
 - Fauche refus avant capselle en graines
 - Revoir fertilisation

Pissenlits et capselles sont révélateurs d'un sol humifère, riche mais compacté en surface, une pratique de sur fertilisation et sur exploitation

*Présence d'autres espèces non relevées dans les poignées:
dactyle, sisymbre (nitrophile, surexploitation), matricaire (sol compacté),
chiendent (mauvais état du sol)*



Plateforme Sursemis

Désherbage « diverses » fin juin

Sursemis 21 septembre 2017

En bandes, largeur semoir 3m

Densité semis: trèfles à 6kg/ha et ray-grass à 20kg/ha

Semoir de l'exploitation de Canappeville:



semoir combiné: herse rotative + disques lemken

Herse rotative utilisée en mode très superficiel

Plateforme Sursemis

Observations en cours, 1^{er} enseignements:

Relevés floristiques sur la bande sursemis TB



**Augmentation
de la
proportion de
Trèfle Blanc**

Autres observations:

- Bandes RGI: plantes levées et bien présentes
- Bandes RGA: rien de flagrant pour l'instant